

Control de malas hierbas

De hoja ancha

Gran variedad de familias y especies, que tienen en común poseer hojas más o menos anchas, y pertenecer al grupo de las dicotiledoneas.


Su control se debe realizar a partir de los dos meses de la implantación del césped mediante 2, 4 - D, MCPA y Dicamba. El producto se debe aplicar en días despejados y sin viento, siempre después de dos días como mínimo de la última siega. El tratamiento se puede repetir al mes o mes y medio, y convendrá repetirlo una vez al año si se observan malas hierbas.



Achillea millefolium



Capsela bursa pastoris



Plantago (Llanten)



Malva sp (Malva)



Taraxacum officinalis

Gramíneas

Poa anua, Grama (Agropyrum y Cynodon), Digitaria

Al ser gramíneas, su erradicación se debe realizar con productos químicos muy selectivos, y que respeten las especies de gramíneas que hemos implantado en nuestro césped. Cuando tenemos un césped formado por numerosas especies de gramíneas, el control químico se hace muy difícil. Por ello se utiliza sobre todo en greens de campos de golf sembrados únicamente con Agrostis. Asulam, MSMA, Fenoxaprop etil, etc.



Agropyrum repens



Digitaria sp



Poa annua

Tabla de herbicidas

CONTROL HOJA ANCHA	Agrostis tenuis	Cynodon dactylon	Poa pratense	Festuca rubra	Festuca arundinacea	Penisetum	Raigrás Inglés	Zoysia japonica	Dichondria
2,4 - D	R	T	T	T	T	R	T	R	N
MCPA	T	T	T	T	T	T	T	T	N
Dicamba	T	T	T	T	T	T	T	T	N
Clorsulfuron	T	T	T	T	N	N	N	N	N
DIGITARIA									
Asulam	N	T	N	N	N	N	N	N	N
POA ANUA									
Atrazina	N	T	N	N	N	N	N	T	N
Fenarimol	N	T	N	N	N	N	N	N	N
Rimsulfuron	N	T	N	N	N	N	N	T	N
SELECTIVO PARA DICHONDRIA									
Fluazifop	N	N	N	N	T	N	N	T	T

R relativamente tolerante

T olerante

N o recomendado