

Plagas más importante del césped

Gusanos del Suelo



Se engloban larvas y orugas de varios insectos, de los cuales los más comunes son el gusano gris y el gusano de alambre. Pueden encontrarse en el suelo sin ocasionar daños, pero cuando su número aumenta pueden causar un daño importante, apareciendo sectores del césped seco. Se controla a base de productos químicos como Foxim, Carbaril, etc.

Típula

(*Tipula oleracea*)



El daño lo generan las larvas. El adulto es una especie de mosquito de largas patas al que le gustan las zonas marítimas de inviernos suaves y lluviosos. Las hembras ponen huevos en la cubierta vegetal. De estos huevos nacen las larvas, que son grises y duras y se alimentan de raíces y cuellos de las plantas durante el día, y por la noche salen a la superficie, alimentándose de tallos y hojas. Cuando el ataque es importante (100 larvas/m²), el césped pierde su sistema radicular, levantándose con facilidad. Para su control se emplean insecticidas como Carbaril, Clorpirifos, Foxim, etc.

Topos



Pequeños roedores que viven bajo tierra, en galerías más o menos extensas, que se alimentan de raíces vegetales principalmente. Pueden llegar a ser un grave problema en el césped, por los montones de tierra que van surgiendo, de forma continúa sino se remedia. Existen diferentes cebos que se incorporan en las entradas de las galerías.

Control del musgo

Musgo



La presencia de musgo en el césped es más frecuente en zonas más o menos sombrías, y de poca aireación del terreno. En estas zonas es conveniente un buen abonado nitrogenado para favorecer que el césped se mantenga bien tupido.

Si el césped está invadido de musgo, utilice nuestro césped reparador antimusgo. Se deberá incorporar el paquete de antimusgo a razón de 20 gr/m² a la zona invadida una vez segado. Al cabo de unos días se observa que el musgo se vuelve negro (muerto), es entonces cuando pasaremos un escarificador o rastrillo, para quitar toda esa materia muerta, pudiéndose recoger con la misma segadora. Posteriormente se incorporará la semilla, se rastrilla ligeramente y se tapa con sustrato multiusos. Se apisona ligeramente y riega. En pocos días la hierba cubrirá las zonas claras.